

# تطعيمات كوفيد-19 أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

Arabic | العربية



الحصول على التطعيم شيء آمن ومهم لصحتك  
وصحة رضيعك

## فوائد لرضيعك

النساء الحوامل المصابات بكوفيد-19 معرضات لخطورة عالية من ولادة أجنة ميتة أو الولادة قبل الأوان. وهناك احتمال أكبر أن يعاني أجنتهن من الكدر أثناء الولادة، أو أن يحتاج أطفالهن إلى العلاج في منطقة الرعاية المركزية لحديثي الولادة في المستشفى.

التطعيم هو أفضل وسيلة لتقليل هذه المخاطر.

## النساء اللواتي يخططن للحمل




تلقي التطعيم قبل الحمل يعني أن من المحتمل أن تكوني في حماية من كوفيد-19 خلال فترة حملك.

- من الأمان أن تصبحي حاملاً قبل تلقي تطعيم كوفيد-19 أو بعده
- التطعيم لا يؤثر على الخصوبة
- ليس من المطلوب منك أن تحصلين على اختبار الحمل قبل تلقي التطعيم

# التطعيمات أثناء الحمل



مواد مترجمة هنا:



“تطعيم كوفيد-19  
آمن خلال فترة  
الحمل، للكِ  
ولجنينك..”



“يُنثابني القلق  
من تلقي التطعيم  
ضد كوفيد-19  
لأنني حامل..”

## ما هو التطعيم الملائم للنساء اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية؟

للحصول على أفضل حماية يُنصح النساء  
الحوامل بتلقي تطعيمات فايزر Pfizer ضد  
كوفيد-19 على الأقل 3 أسابيع بين كل جرعة  
وأخرى، أو تطعيمات موديرنا Moderna ضد  
كوفيد-19 على الأقل 4 أسابيع بين كل  
جرعة وأخرى.

فايزر Pfizer أو موديرنا Moderna هما  
التطعيمان اللذان يُنصح بهما ضد كوفيد-19  
للنساء الحوامل أو اللواتي يرضعن أطفالهن  
رضاعة طبيعية أو ينون الحمل.

تدل البحوث أن هذان التطعيمان آمنان  
للحوامل ومن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية  
وبإمكانهن تلقي هذان التطعيمان في أي مرحلة  
من مراحل الحمل.

### الأعراض الجانبية الاعتيادية

- ألم في موضع الحقن
- نوبات صداع
- ألم في العضلات
- قشعريرة وحمى
- ألم في المفاصل
- إسهال

### هل هناك أي أعراض جانبية؟

لم تُسفر الدراسات من جميع أنحاء العالم عن  
وجود أي أعراض جانبية محددة للنساء الحوامل  
أو أطفالهن. ومع ذلك، يُحتمل أن يكون هناك  
أعراض جانبية نادرة جدًا لم تكتشف بعد.