


واکسن های کووید 19 در دوران بارداری و شیردهی به نوزاد

فارسی | Farsi



واکسینه شدن بی خطر است و برای سلامتی
شما و نوزادتان مهم می باشد.

منافع برای نوزادتان

زنان باردار مبتلا به COVID-19 در معرض خطر بیشتری برای مرده زایی یا
زایمان زودرس قرار دارند نوزادان آنها نیز احتمال بیشتری دارد در هنگام زایمان
ناراحتی نشان می دهد یا در بخش مراقبت های ویژه نوزادان تازه متولد شده در
بیمارستان نیاز به درمان داشته باشند
واکسیناسیون بهترین راه برای کاهش دادن این خطرات است.

زنانی که برای بارداری برنامه ریزی می کنند

واکسینه شدن قبل از بارداری به این معنی است که شما احتمالاً در طول
بارداری خود در برابر COVID-19 محافظت خواهید داشت

- باردار شدن در قبل یا بعد از واکسیناسیون کووید-19 بی خطر است
- واکسیناسیون بر باروری تاثیری ندارد
- لازم نیست قبل از واکسینه شدن، تست بارداری بدهید



واکسیناسیون در طول مدت بارداری



منابع ترجمه شده د
را در اینجا هستند:



”واکسیناسیون
19-COVID در دوران
بارداری برای شما
و نوزادتان بی
خطر است..“



”من در مورد دریافت
واکسیناسیون
19-COVID نگرانم
چون باردار هستم..“

کدام واکسن برای زنانی که به نوزاد شیر می دهند، می باشد؟

برای بهترین محافظت، به زنان باردار توصیه
می شود که واکسن های فایزر 19-COVID را
با فاصله حداقل 3 هفته از هم یا واکسن های
19-COVID مدرنا را حداقل با فاصله 4 هفته
از هم دریافت کنند.

فایزر یا مدرنا واکسن های 19-COVID هستند
که برای زنان باردار، زنانی که به بچه شیر می
دهند، یا برای بارداری برنامه ریزی می کنند،
توصیه می شوند.

پژوهش ها نشان می دهد که این واکسن ها
برای زنان باردار و زنانی که به بچه شیر می
دهند، بی خطر بوده و آنها می توانند در هر
مرحله ای از بارداری واکسن را دریافت کنند.

عوارض جانبی معمول

- درد در محل تزریق
- سردرد
- درد عضلانی
- لرز و تب
- درد مفاصل
- اسهال

آیا هیچ عوارض جانبی وجود دارد؟

مطالعات انجام شده در سراسر جهان هیچ گونه
عوارض جانبی خاصی برای زنان باردار یا نوزادان
آنها پیدا نکرده است. با این حال، ممکن است
عوارض جانبی خیلی نادر وجود داشته باشد که
هنوز پیدا نشده اند.