

Vaccini contro il COVID-19 durante la gravidanza e l'allattamento

Italian | Italiano

Vaccinarsi è sicuro ed è importante per
la tua salute e quella del tuo bambino

Benefici per il tuo bambino


Le donne incinte affette dal COVID-19 hanno un rischio maggiore di parto prematuro o di morte del bambino alla nascita. I loro bambini hanno anche maggiori probabilità di sviluppare sofferenza fetale durante il parto, o di aver bisogno di cure ospedaliere in terapia intensiva neonatale.

La vaccinazione è il modo migliore per ridurre questi rischi.

Donne che stanno pianificando una gravidanza

Farsi vaccinare prima del concepimento significa avere una maggiore probabilità di protezione contro il COVID-19 durante tutta la gravidanza.

- Rimanere incinta prima o dopo una vaccinazione per il COVID-19 è sicuro
- La vaccinazione non influisce sulla fertilità
- Non è necessario fare un test di gravidanza prima di farsi vaccinare



Vaccinazioni durante la gravidanza

Materiali tradotti qui:



“Sono preoccupata di fare la vaccinazione per il COVID-19 perché sono incinta...”



acm
Australian College of
Midwives

“La vaccinazione per il COVID-19 è sicura durante la gravidanza, per te e per il tuo bambino...”

Qual è il vaccino adatto alle donne in allattamento?

Pfizer o Moderna sono i vaccini per il COVID-19 raccomandati per le donne incinte, in allattamento o che stanno pianificando una gravidanza.

Le ricerche dimostrano che questi vaccini sono sicuri per le donne incinte e che allattano, e che queste possono ricevere il vaccino in qualsiasi fase della gravidanza.

Ci sono effetti collaterali?

Studi in tutto il mondo non hanno rilevato effetti collaterali specifici per le donne incinte o i loro bambini. Tuttavia, è possibile che ci siano effetti collaterali molto rari che non sono ancora stati rilevati.

Per la migliore protezione, si raccomanda alle donne incinte di ricevere i vaccini Pfizer per il COVID-19 ad almeno 3 settimane di distanza l'uno dall'altro, o i vaccini Moderna per il COVID-19 con un intervallo di almeno 4 settimane.

Effetti collaterali standard

- **Dolore al punto d'inoculazione**
- **Mal di testa**
- **Dolori muscolari**
- **Febbre e brividi**
- **Dolori articolari**
- **Diarrea**