


Vắc-xin ngừa COVID-19 trong thời kỳ mang thai và cho con bú

Vietnamese | Tiếng Việt

Chích ngừa là an toàn và quan trọng đối
với sức khỏe của quý vị và con quý vị



Những lợi ích cho con của quý vị

Phụ nữ mang thai bị COVID-19 có nguy cơ cao hơn để bị sảy thai hoặc sinh non. Con của họ cũng có nhiều khả năng cho thấy các biểu hiện đau đớn trong khi sinh hoặc cần được điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh trong bệnh viện.

Chích ngừa là cách tốt nhất để giảm thiểu những rủi ro này.

Phụ nữ có dự định mang thai

Chích ngừa trước khi thụ thai có nghĩa là quý vị có khả năng bảo vệ chống lại COVID-19 trong suốt thai kỳ.

- Mang thai trước hoặc sau khi chích ngừa COVID-19 đều an toàn
- Chích ngừa không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
- Quý vị không cần phải thử thai trước khi chích ngừa



Chích ngừa trong khi mang thai

Các tài liệu được dịch thuật có ở đây:



acm
Australian College of
Midwives

“Tôi lo lắng về việc chích ngừa COVID-19 khi tôi đang mang thai..”



“Chích ngừa COVID-19 là an toàn trong khi mang thai, cho quý vị và con quý vị..”

Loại vắc-xin nào cho phụ nữ đang cho con bú?

Pfizer hoặc Moderna là các loại vắc-xin COVID-19 được đề nghị cho phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú hoặc dự định mang thai.

Nghiên cứu cho thấy những loại vắc-xin này an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú và họ có thể tiêm vắc-xin này vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.

Để được bảo vệ tốt nhất, phụ nữ có thai nên tiêm vắc-xin Pfizer COVID-19 cách nhau ít nhất 3 tuần, hoặc vắc-xin Moderna COVID-19 cách nhau ít nhất 4 tuần.

Có bất kỳ tác dụng phụ nào không?

Các nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã không tìm ra bất kỳ tác dụng phụ nào cụ thể cho phụ nữ mang thai hoặc con của họ. Tuy nhiên, có thể có những tác dụng phụ rất hiếm nhưng vẫn chưa được tìm ra.

Những tác dụng phụ thông thường

- Đau tại chỗ tiêm
- Nhức đầu
- Đau cơ
- Ớn lạnh và sốt
- Đau khớp
- Tiêu chảy